



kijkt verder



Coronavirus

afname monsters

Onderzoeken

verzendmateriaal:

- Keel en Nasopharynx uitstrijk nr 18: UTM
- Sputum nr 8: steriel potje
- BAL

Zorg dat er per afname een separate aanvraag wordt geplaatst bij PAMM!

Zie ook het diagnostisch vademecum van PAMM

Persoonlijke bescherming afnemer

- **Mondneusmasker**

- minimaal FFP1 (indien hoge verdenking: FFP2)
- Fit-test masker: Plaats masker, druk buigzame rand goed om de neus. Indeuken bij inademing. Uitdeuken bij uitademing. 'Voel' of het masker goed afsluit en geen lekkage vertoont.

- **Bril**

- **Schort**

- **Handschoenen**

Algemene opmerkingen

- Gaarne vooraf contact met de arts-microbioloog
- Materiaal wat vóór 13:00 binnenkomt is normaliter dezelfde dag bekend
- Graag één aanvraagformulier per ingezonden materiaal
- Houd de aanvraagformulieren tenminste buiten de 2m cirkel
- **Let op:** indien men ook wenst de POCT influenza A/B in te zetten: indien hoge verdenking op coronavirus, ook opzetten van FFP2 masker!

Vorbereiding


- Op >2 meter afstand van de patiënt
- Alles klaarleggen op een absorberende onderlegger (inclusief handalcohol, spuitflacon alcohol 70%, eventueel houten spatel, afvalzakken)
- Doe beschermende kleding aan vóór betreden van de 2m cirkel*:
 - Masker (fit-test)
 - Handschoenen
 - Schort
 - Bril

*In de praktijk buiten de kamer van patiënt

Afnamelocaties

Diepe neuswat / Nasopharynx

Keelwat / Oropharynx



Keeluitstrijk

- Laat de patiënt het hoofd licht achterover buigen
- Gebruik zo nodig de houten spatel
- Steek de keelwat zo diep mogelijk achter in de keel
- Draai en strijk in de achterste keelholte
- Stop de wattenstok in de buis met transport-medium; het rode streepje op de wattenstok geeft het afbreekpunt weer.
- Let op: het afgebroken deel van de wattenstok is besmet afval.



Keeluitstrijk: PAMM nr. 18; gebruik de stuggere wat

Nasopharynxuitstrijk

- Laat de patiënt vooraf de neus snuiten
- Laat de patiënt het hoofd achterover buigen
- Trek de neuspunt iets omhoog
- Breng de flexibele uitstrijkvat loodrecht op het gezicht in de neus en schuif recht over de neusbodem naar achteren tot u een weerstand voelt
- Roteer de wattenstok enkele malen en trek in één beweging terug
- Stop de wattenstok in de buis met transport-medium; het rode streepje op de wattenstok geeft het afbreekpunt weer.
- Let op: het afgebroken deel van de wattenstok is besmet afval.



Nasopharynxuitstrijk: PAMM nr. 18; gebruik de met dunne, flexibele wat

Sputum

- Sputum kan in een wegwerpbakje worden opgevangen waarna een deel van het sputum overgebracht wordt in een steriel potje.
- Potje goed afsluiten
- Restant sputum is besmet afval



Opsturen & opruimen

- Desinfecteer het receptaculum met alcohol 70%. Laat dit 1 minuut inwerken.
 - Doe de handschoenen uit (via 'schone' binnenkant lostrekken)
 - Toepassen handhygiëne m.b.v. handalcohol
 - Doe de schort en bril af
 - Doe het masker af
 - Alle gebruikte materialen in een afvalzak
 - Opnieuw toepassen van handhygiëne m.b.v. handalcohol
-
- Indien transport middels taxi plaatsvindt, zorg dan voor verpakking volgens UN3373 richtlijnen (in een blister of transportkoffer)